

Fungisida

TORBINOL

480 SC



Diproduksi oleh :

**Saprotan
utama**

FERTILIZERS • PESTICIDES • SEEDS

Pemegang Pendaftaran :
SAPROTAN UTAMA
Brigjend Sudiarto 79
Semarang - Indonesia
p: +62 24 8413208
f: +62 24 8413203
e: info@saprotan-utama.com
www.saprotan-utama.com



DESKRIPSI TORBINOL 480 SC

TORBINOL 480 SC adalah fungisida sistemik yang bersifat protektif berbentuk pekatan suspensi, untuk mengendalikan penyakit blas *Pyricularia oryzae* pada tanaman padi, penyakit antraknosa *Colletotrichum sp.* pada tanaman cabai, dan penyakit bercak coklat *Alternaria solani* pada tanaman tomat.

**BAHAN AKTIF : azoksistrobin : 300 g/l
: difenokonazol :180 g/l**

KEUNGGULAN TORBINOL 480 SC

- 1.Campuran dua bahan aktif sekaligus yang efektif untuk pertumbuhan tanaman.
- 2.Mempunyai kandungan bahan aktif yang lebih tinggi.
- 3.Mempunyai spektrum efikasi yang lebih luas.
- 4.Formulasi SC mudah larut dalam air, mudah digunakan dan tidak menyumbat alat semprot.
- 5.Hemat dan mudah dalam pemakaian.
- 6.Bekerja secara sistemik dan mampu mengendalikan penyakit dalam jaringan tanaman.

PETUNJUK PENGGUNAAN TORBINOL 480 SC

| Tanaman | Sasaran | Dosis | konsentrasi | Cara dan Waktu Aplikasi |
|---------|--|--------------------------|--------------------------------------|---|
| Padi | Penyakit blas <i>pyriculana oryzae</i> | (200 - 300 ml/hektar) | | Penyemprotan volume tinggi |
| Cabai | Penyakit antraknosa (<i>Colletotrichum sp.</i>) | | Penyemprotan volume tinggi 1 ml/l | Penyemprotan dilakukan apabila ditemukan gejala serangan penyakit pada tanaman. |
| Tomat | Penyakit bercak coklat (<i>Alternaria solani</i>) | | | Apabila belum jelas hubungi petugas pertanian yang berwenang. |

Keterangan :

Gunakan dosis sesuai anjuran.



Penyakit blas
(*Pyricularia oryzae*)



Penyakit antraknosa
(*Colletotrichum sp.*)



Penyakit bercak coklat
(*Alternaria solani*)



PERHATIAN

